Feuille d'exercices n° 2 : corrigés

Exercice 2

On fixe un entier naturel p . On va montrer par récurrence sur l'entier q la propriété suivante :

$\mathcal{P}(q)$: « $F_q \equiv 2 \pmod{F_p}$ ».

- initialisation : lorsque q vaut $p + 1$, on observe que :

$$\begin{aligned}F_{p+1} - 2 &= 2^{2^{p+1}} - 1 \\ &= (2^{2^p} + 1) \times (2^{2^p} - 1) \\ &= F_p \times (F_p - 2).\end{aligned}$$

On obtient bien que la quantité $F_{p+1} - 2$ est un entier multiple de F_p , d'où la propriété vérifiée au rang $p + 1$.

- hérédité : on suppose la propriété $\mathcal{P}(q)$ vraie pour un certain entier $q > p$. Au rang suivant, on obtient :

$$F_{q+1} - 2 = F_q \times (F_q - 2).$$

L'entier $F_q - 2$ est un multiple de F_p , donc l'entier $F_{q+1} - 2$ également. On a ce qu'il faut au rang suivant.

Exercice 4

On montre par récurrence la propriété :

$\mathcal{P}(n)$: « pour tous réels $x_1, \dots, x_n$ strictement positifs, alors :

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \times \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{x_j} \right) \geq n^2 \text{ »}.$$

- initialisation : au rang $n = 1$, soit x_1 un réel strictement positif. On obtient directement :

$$x_1 \times \frac{1}{x_1} = 1 \geq 1^2$$

et la propriété $\mathcal{P}(1)$ est vérifiée.

- hérédité : on suppose la propriété $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un certain entier naturel strictement positif n .

On considère maintenant $x_1, \dots, x_{n+1}$, des nombres réels strictement positifs.
On en déduit :

$$A = \left(\sum_{i=1}^{n+1} x_i \right) \times \left(\sum_{j=1}^{n+1} \frac{1}{x_j} \right) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \times \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{x_j} \right) + \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_{n+1}} + \sum_{j=1}^n \frac{x_{n+1}}{x_j} + \frac{x_{n+1}}{x_{n+1}}.$$

La quantité $\left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \times \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{x_j} \right)$ est supérieure ou égale à n^2 par hypothèse de récurrence.

Ensuite, on remarque que pour tout réel $a > 0$, alors :

$$a + \frac{1}{a} \geq 2.$$

En effet,

$$a + \frac{1}{a} - 2 = \frac{a^2 + 1 - 2a}{a} = \frac{(a-1)^2}{a} \geq 0.$$

En appliquant ceci aux réels $a = \frac{x_i}{x_{n+1}}$, on obtient :

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{x_{n+1}} + \frac{x_{n+1}}{x_i} \right) \geq \sum_{i=1}^n 2 = 2n.$$

Conclusion,

$$A \geq n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2,$$

ce que l'on voulait au rang suivant.

Exercice 5

1. On montre par récurrence forte la propriété :

$$\mathcal{P}(n) : \ll f(n) = n \gg.$$

- initialisation : lorsque $n = 0$, on a d'une part $f(0) \leq 0$ et d'autre part $f(0) \in \mathbb{N}$, imposant $f(0) = 0$. La propriété $\mathcal{P}(0)$ est vérifiée.

- hérédité : on suppose les propriétés $\mathcal{P}(k)$ vraies jusqu'à un certain entier naturel n . L'élément $f(n+1)$ vérifie $f(n+1) \leq n+1$. Par injectivité, l'élément $f(n+1)$ est différent des éléments $f(0), f(1), \dots, f(n)$, qui valent $0, 1, \dots, n$ par hypothèse de récurrence forte.

Conclusion, $f(n+1) \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket \setminus \llbracket 0, n \rrbracket = \{n+1\}$, d'où $f(n+1) = n+1$.

On a la propriété voulue au rang suivant.

2. On montre par récurrence forte la même propriété $\mathcal{P}(n) : \ll f(n) = n \gg$.

- initialisation : par surjectivité de la fonction f , l'élément 0 admet au moins un antécédent par la fonction f . On note m un tel antécédent de sorte que :

$$0 = f(m) \geq m.$$

Nécessairement, $m = 0$ et finalement $f(0) = 0$. La propriété $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

• hérédité : on suppose les propriétés $\mathcal{P}(k)$ vraies jusqu'à un certain entier naturel n . L'élément $n + 1$ admet au moins un antécédent par la fonction f . Il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $f(k) = n + 1$.

Par hypothèse de récurrence forte, il est impossible que k soit inférieur ou égal à n car sinon on aurait $f(k) = k \neq n + 1$.

Donc, $k \geq n + 1$. Or, $n + 1 = f(k) \geq k$, donc finalement l'entier k vaut $n + 1$ et $f(n + 1) = n + 1$. On a la propriété au rang suivant.

Exercice 6

On procède par analyse / synthèse.

Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convenable.

On pose $f(1) = a$.

On montre par récurrence la propriété :

$\mathcal{P}(n) : \ll f(n) = n \cdot a \gg$

• initialisation : lorsque $n = 0$, en appliquant l'hypothèse de l'énoncé aux entiers $p = q = 0$, on obtient $f(0) = 2f(0)$, puis $f(0) = 0 = 0 \times a$. La propriété $\mathcal{P}(0)$ est vérifiée.

• hérédité : supposons la propriété $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un certain entier naturel n .

On en déduit par hypothèse portant sur la fonction f :

$$f(n + 1) = f(n) + f(1).$$

En utilisant maintenant l'hypothèse de récurrence, on peut écrire :

$$f(n + 1) = n \cdot a + a = (n + 1) \cdot a,$$

donnant la propriété $\mathcal{P}(n + 1)$.

Conclusion, la fonction f est la fonction $f : n \mapsto n \cdot a$.

La phase d'analyse est terminée.

En synthèse, pour tout réel a , il est facile de voir que la fonction :

$$f : n \mapsto n \cdot a$$

vérifie :

$$\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, f(p + q) = f(p) + f(q).$$

Toutes les fonctions solutions sont donc les fonctions de la forme :

$$f : n \mapsto n \cdot a,$$

pour n'importe quel réel a .

Exercice 7

Attention ici à la formulation de l'hypothèse de récurrence. Il faut être précis.

On démontre par récurrence sur l'entier n la propriété :

$\mathcal{P}(n)$ « pour tous nombres complexes $z_1, \dots, z_n$, alors :

$$\left(z_1 + \dots + z_n\right)^p = p! \times \sum_{\substack{k_1, \dots, k_n = 0 \\ k_1 + \dots + k_n = p}}^p \frac{z_1^{k_1} \times \dots \times z_n^{k_n}}{k_1! \times \dots \times k_n!} \gg.$$

• Lorsque $n = 1$, la formule à montrer devient pour tout complexe z_1 et pour tout entier naturel p :

$$z_1^p = p! \times \frac{z_1^p}{p!},$$

qui est vraie, la somme ne comportant qu'un seul terme associé à l'indice $k_1 = p$.

• On suppose la propriété $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un certain naturel $n \geq 1$.

Soient $z_1, \dots, z_{n+1}$ des nombres réels et $p \in \mathbb{N}$.

En posant $A = z_1 + \dots + z_n$, en appliquant la formule du binôme dans $\mathbb{C}$ commutatif :

$$\begin{aligned} \left(z_1 + \dots + z_{n+1}\right)^p &= \left(A + z_{n+1}\right)^p \\ &= \sum_{k=0}^p \frac{p!}{k!(p-k)!} A^k z_{n+1}^{p-k} \\ &= p! \sum_{k=0}^p \frac{1}{k!(p-k)!} \left[k! \sum_{i_1 + \dots + i_n = k} \frac{z_1^{i_1} \times \dots \times z_n^{i_n}}{i_1! \times \dots \times i_n!} \right] z_{n+1}^{p-k} \end{aligned}$$

le terme entre crochets provenant de l'hypothèse de récurrence appliquée aux complexes $z_1, \dots, z_n$ et à l'entier naturel k .

On obtient alors en posant l'indice $i_{n+1} = p - k$:

$$\left(z_1 + \dots + z_{n+1}\right)^p = p! \sum_{i_1 + \dots + i_n + i_{n+1} = p} \frac{z_1^{i_1} \times \dots \times z_n^{i_n} \times z_{n+1}^{i_{n+1}}}{i_1! \times \dots \times i_n! \times i_{n+1}!}$$

ce qui donne la formule voulue au rang suivant.

Exercice 8

• On obtient en découpant la somme :

$$\begin{aligned} A &= \sum_{p,q=1}^n \min\{p, q\} \\ &= \sum_{p=1}^n \left(\sum_{q=1}^n \min\{p, q\} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{p=1}^n \left(\sum_{q=1}^p q + \sum_{q=p+1}^n p \right) \\
&= \sum_{p=1}^n \left(\frac{p(p+1)}{2} + p \times (n-p) \right) \quad [\text{sommets arithm\u00e9tiques}] \\
&= \sum_{p=1}^n \left(-\frac{p^2}{2} + \left(n + \frac{1}{2} \right) p \right) \\
&= -\frac{1}{2} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \left(n + \frac{1}{2} \right) \times \frac{n(n+1)}{2} \\
&= n(n+1)(2n+1) \times \left(-\frac{1}{12} + \frac{1}{4} \right) \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.
\end{aligned}$$

• De la m\u00eame fa\u00e7on :

$$\begin{aligned}
B &= \sum_{p,q=1}^n \max\{p, q\} \\
&= \sum_{p=1}^n \left(\sum_{q=1}^n \max\{p, q\} \right) \\
&= \sum_{p=1}^n \left(\sum_{q=1}^p p + \sum_{q=p+1}^n q \right) \\
&= \sum_{p=1}^n \left(p^2 + \frac{p+1+n}{2} \cdot (n-p) \right) \quad [\text{somme arithm\u00e9tique}] \\
&= \sum_{p=1}^n \left(\frac{p^2}{2} - \frac{p}{2} + \frac{n(n+1)}{2} \right) \\
&= \frac{1}{2} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{1}{2} \times \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} \times n \\
&= \frac{n(n+1)}{12} \times (2n+1-3+6n) \\
&= \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}.
\end{aligned}$$

Exercice 9

• En utilisant la fonction $f : t \mapsto \sum_{k=1}^n t^k = t \times \frac{1-t^n}{1-t}$, d\u00e9finie sur $]1, +\infty[$, on en d\u00e9duit apr\u00e8s d\u00e9rivation :

$$f' : t \mapsto \frac{1-t^n}{1-t} + t \times \frac{-nt^{n-1}(1-t) + 1-t^n}{(1-t)^2}$$

et d'autre part :

$$f' : t \mapsto \sum_{k=1}^n k t^{k-1}.$$

On remarque maintenant que :

$$2 \times f'(2) = 2 \times \sum_{k=1}^n k 2^{k-1} = \sum_{k=1}^n k 2^k = 2 \times (2^n - 1 + 2 \times (1 - 2^n + n2^{n-1})).$$

Conclusion, la somme à calculer vaut après simplifications : $(n-1)2^{n+1} + 2.$

- On pose la fonction $g : t \mapsto \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} t^k = (1+t)^n$. Cette fonction est dérivable et :

$$g' : t \mapsto \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k t^{k-1} = n(1+t)^{n-1}.$$

Il suffit maintenant d'appliquer tout ceci à $t = 1$ pour obtenir que la somme à calculer vaut

$$n 2^{n-1}.$$

- On peut linéariser $\cos^2 \theta$ à l'aide des formules trigonométriques puis calculer la somme de cosinus à l'aide d'une partie réelle de nombres complexes, puis faire intervenir des sommes géométriques.

On décide ici d'imposer un changement de variable par inversion. Cela donne :

$$\begin{aligned} T_n &= \sum_{k=0}^n \cos^2 \left(\frac{k\pi}{2n} \right) \\ &= \sum_{\ell=0}^n \cos^2 \left(\frac{(n-\ell)\pi}{2n} \right) \\ &= \sum_{\ell=0}^n \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\ell\pi}{2n} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{k\pi}{2n} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2n} \right). \end{aligned}$$

Conclusion,

$$\begin{aligned} 2T_n &= \sum_{k=0}^n \cos^2 \left(\frac{k\pi}{2n} \right) + \sum_{k=0}^n \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2n} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\cos^2 \left(\frac{k\pi}{2n} \right) + \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2n} \right) \right) \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=0}^n 1 = n + 1$$

et donc :

$$T_n = \frac{n+1}{2}.$$

Exercice 10

On ne détaille que la première question, le reste étant proche du cours, en utilisant des dérivations ou des nombres complexes ...

- Pour le calcul de $A = \sum_{k=0}^n k \cdot \binom{n}{k}$, il y a deux méthodes :

- méthode par dérivation

On pose la fonction $f : x \mapsto \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n$.

La dérivée donne :

$$f' : x \mapsto \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} kx^{k-1} = n(1+x)^{n-1}.$$

Il suffit d'évaluer le tout en $x = 1$ ce qui donne :

$$A = f'(1) = n \cdot 2^{n-1}.$$

- on simplifie chaque terme

On peut faire commencer la somme à partir de $k = 1$ car pour $k = 0$, le terme est nul. Ensuite,

$$\begin{aligned} \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, k \binom{n}{k} &= k \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} \\ &= n \binom{n-1}{k-1}. \end{aligned}$$

On en déduit la suite des calculs :

$$\begin{aligned} A &= \sum_{k=1}^n k \cdot \binom{n}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n n \cdot \binom{n-1}{k-1} \\ &= n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \quad [\text{changement d'indice}] \\ &= n \times 2^{n-1}. \end{aligned}$$

Pour le calcul de $B = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}$, il y a de nouveau deux méthodes.

- méthode par intégration

On interprète la somme comme l'intégrale d'une autre somme :

$$\begin{aligned}
 B &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \int_0^1 t^k dt \\
 &= \int_0^1 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} t^k dt \\
 &= \int_0^1 (t+1)^n dt \quad [\text{binôme dans } \mathbb{R} \text{ commutatif}] \\
 &= \left[\frac{(t+1)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 \\
 &= \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}.
 \end{aligned}$$

- on simplifie chaque terme :

$$\begin{aligned}
 \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} &= \frac{1}{k+1} \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
 &= \frac{n!}{(k+1)!(n+1-(k+1))!} \\
 &= \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}.
 \end{aligned}$$

On en déduit la suite des calculs :

$$\begin{aligned}
 B &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} \binom{n}{k} \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1} \\
 &= \frac{1}{n+1} \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n+1}{\ell} \quad [\text{changement d'indice } \ell = k+1] \\
 &= \frac{1}{n+1} \left(\sum_{\ell=0}^{n+1} \binom{n+1}{\ell} - 1 \right) \\
 &= \frac{1}{n+1} (2^{n+1} - 1) \quad [\text{binôme dans } \mathbb{R} \text{ commutatif}].
 \end{aligned}$$

Exercice 13

On considère la somme :

$$Z = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = (1 + (-1))^n.$$

Cette quantité vaut 0^n qui vaut 0 si l'entier n vaut 0 et 1 sinon.

Or, on voit qu'en séparant les termes d'indices $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ selon la parité de l'entier k , alors :

$$Z = A - B.$$

Par ailleurs, il est facile de voir que :

$$A + B = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = (1 + 1)^n = 2^n.$$

Conclusion,

→ si $n = 0$, alors $A = 1$ et $B = 0$

→ si $n \geq 1$, alors $A = B = 2^{n-1}$.

Exercice 15

• Soit m un nombre complexe.

On utilise les opérations $L_4 \leftarrow L_4 - m^3 L_1$, puis $L_3 \leftarrow L_3 - m^2 L_1$ et ensuite $L_2 \leftarrow L_2 - m L_1$.

On obtient les systèmes équivalents en matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & m & m^2 & m^3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - m^4 & 1 - m \\ 0 & 0 & 1 - m^4 & m(1 - m^4) & 1 - m^2 \\ 0 & 1 - m^4 & m(1 - m^4) & m^2(1 - m^4) & 1 - m^3 \end{array} \right) \iff \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & m & m^2 & m^3 & 1 \\ 0 & 1 - m^4 & m(1 - m^4) & m^2(1 - m^4) & 1 - m^3 \\ 0 & 0 & 1 - m^4 & m(1 - m^4) & 1 - m^2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - m^4 & 1 - m \end{array} \right).$$

On distingue maintenant plusieurs cas :

- si $m^4 \neq 1$, alors on a un système triangulaire de Cramer : on n'a qu'une seule solution qui est facile à obtenir en fonction du paramètre m ; on ne détaille pas...
- si $m^4 = 1$, alors $m \in \{\pm 1, \pm i\}$ et on distingue encore plusieurs sous-cas :
  - si $m \neq 1$, alors la dernière équation devient $0 = 1 - m$, qui est incompatible. Le système n'admet alors aucune solution.
  - si $m = 1$, le système est équivalent au système d'une seule équation à quatre inconnues :

$$x + y + z + t = 1 \iff x = 1 - y - z - t$$

de solutions :

$$\{(1 - y - z - t, y, z, t) ; (y, z, t) \in \mathbb{C}^3\}.$$

- On fixe deux complexes a et b dans $\mathbb{C}$. On fixe un entier $n \geq 2$.

Le plus simple pour résoudre le système proposé est d'utiliser des substitutions, sans utiliser l'algorithme de Gauss.

Si $(x_1, \dots, x_n)$ est une solution, alors en remplaçant successivement $x_2, x_3, \dots, x_n$ par leur formule en fonction de x_1 , on obtient :

$$\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket, x_i = b \left(\sum_{k=0}^{i-2} a^k \right) + a^{i-1} x_1.$$

On en déduit que :

$$x_n = b \left(\sum_{k=0}^{n-2} a^k \right) + a^{n-1} x_1.$$

On utilise maintenant la dernière équation, aboutissant à :

$$x_1 = b \left(\sum_{k=0}^{n-1} a^k \right) + a^n x_1.$$

On distingue maintenant deux cas :

- si $a^n \neq 1$, alors la dernière ligne donne explicitement une seule valeur de x_1 , puis en cascade, on obtient les valeurs de $x_2, \dots, x_n$. On a dans ce cas une seule solution.
- si $a^n = 1$, la dernière ligne devient :

$$b \left(\sum_{k=0}^{n-1} a^k \right) = 0.$$

On distingue deux sous-cas :

- ▷ si $a = 1$, la dernière ligne amène $b \times n = 0$.

Si $b \neq 0$, alors le système est incompatible.

Si $b = 0$, alors le système devient $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ de solutions formant l'ensemble :

$$\left\{ (t, t, \dots, t) ; t \in \mathbb{C} \right\}.$$

- ▷ si $a \neq 1$, alors la somme $\sum_{k=0}^{n-1} a^k = \frac{1-a^n}{1-a}$ est nulle et la dernière équation devient $0 = 0$.

On obtient alors les solutions en exprimant pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$,

$$x_i = b \left(\sum_{k=0}^{i-2} a^k \right) + a^{i-1} x_1,$$

le complexe x_1 étant quelconque.

Exercice 18

1. On procède par analyse / synthèse.

Soient a , b et c trois nombres convenables. En mettant le tout sur le même dénominateur $X(X+1)(X+2)$, on obtient :

$$\frac{a}{X} + \frac{b}{X+1} + \frac{c}{X+2} = \frac{a(X^2 + 3X + 2) + b(X^2 + 2X) + c(X^2 + X)}{X(X+1)(X+2)}.$$

Or :

$$a(X^2 + 3X + 2) + b(X^2 + 2X) + c(X^2 + X) = (a + b + c)X^2 + (3a + 2b + c)X + 2a.$$

Ce polynôme doit être égal à 1, imposant le système linéaire :

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ 3a + 2b + c = 0 \\ 2a = 1 \end{cases}.$$

La résolution – par exemple par la méthode du pivot de Gauss – permet d'obtenir :

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = -1 \quad \text{et} \quad c = \frac{1}{2}.$$

La synthèse est facile à faire. En choisissant ces trois nombres, on peut facilement remonter les calculs et vérifier que ces valeurs conviennent.

2. Soit $n \geq 1$ un entier.

On va utiliser un télescopage de sommes :

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k} - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2(k+2)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k} + \frac{1}{2} \sum_{k=3}^{n+2} \frac{1}{k} \quad [\text{changements d'indices}] \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n+1} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right) \quad [\text{télescopages}] \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} \right). \end{aligned}$$

On obtient une formule assez simple de S_n .

On obtient immédiatement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{1}{4}.$$

Exercice 19

1. Par la formule du binôme, comme 1 et X commutent :

$$(1 + X)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} X^k.$$

Si k est un entier entre 0 et $2n$ le coefficient en X^k dans cette expression est :

$$\binom{2n}{k}.$$

2. On peut effectuer un calcul différent, comme suit :

$$\begin{aligned} (1+X)^n \times (1+X)^n &= \left(\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} X^i \right) \times \left(\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} X^j \right) \\ &= \sum_{i,j=0}^n \binom{n}{i} \cdot \binom{n}{j} X^{i+j}. \end{aligned}$$

Si k est un entier entre 0 et $2n$, le coefficient en X^k dans le produit $(1+X)^n \times (1+X)^n$ revient à comptabiliser tous les coefficients devant X^{i+j} , lorsque i et j sont des entiers naturels compris entre 0 et n **et tels que $i+j$ soit égal à k** .

On en déduit que le coefficient en X^k vaut :

$$\sum_{i,j=0}^n \text{et } i+j=k \binom{n}{i} \cdot \binom{n}{j} = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} \cdot \binom{n}{k-r}.$$

3. On en déduit par les deux questions précédentes cette très belle formule :

$$\sum_{p=0}^n \binom{n}{p}^2 = \binom{2n}{n}.$$

4. On peut tout généraliser. On fixe a , b et q dans $\mathbb{N}$.

On peut procéder comme précédemment en calculant de deux manières différentes le coefficient en X^q dans l'égalité :

$$(1+X)^{a+b} = (1+X)^a \times (1+X)^b$$

ce qui nous donne d'une part avec le polynôme de gauche un coefficient en X^q égal à :

$$\binom{a+b}{q}$$

et d'autre part, avec le polynôme de gauche un coefficient en X^q égal à :

$$\sum_{0 \leq i \leq a; 0 \leq j \leq b \text{ et } i+j=q} \binom{a}{i} \cdot \binom{b}{j},$$

ce qui nous donne exactement ce qu'il faut en procédant au changement de notation $k = i$ (et donc $j = q - k$).

Il s'agit d'un exercice classique à savoir refaire et qui constituait la première question du sujet des Mines II de la session 2020.

Exercice 20

1. Dans toute la suite, on note $S(p, n)$, le nombre de solutions dans $\mathbb{N}^p$ à l'équation $\sum_{k=1}^p x_k = n$.

On tente de « deviner » une formule. On va ensuite effectuer une récurrence sur l'entier p .

• Lorsque $p = 1$, l'équation se résume à :

$$x_1 = n$$

et il n'y a qu'une seule solution :

$$\forall n \in \mathbb{N}, S(1, n) = 1.$$

• Fixons un entier $p \geq 2$. On va partitionner l'ensemble des solutions selon la valeur de x_p , cette valeur pouvant décrire tous les entiers entre 0 et n . On peut écrire :

$$\left\{ (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{N}^p \mid \sum_{k=1}^p x_k = n \right\} = \bigsqcup_{r=0}^n \left\{ (x_1, \dots, x_{p-1}, r) \in \mathbb{N}^p \mid \sum_{k=1}^{p-1} x_k = n - r \right\}.$$

On voit aussi qu'il y a autant d'éléments dans l'ensemble

$$\left\{ (x_1, \dots, x_{p-1}, r) \in \mathbb{N}^p \mid \sum_{k=1}^{p-1} x_k = n - r \right\}$$

que de solutions dans $\mathbb{N}^{p-1}$ à l'équation :

$$\sum_{k=1}^{p-1} x_k = n - r.$$

Cela fait donc un ensemble de cardinal $S(p-1, n-r)$.

On vient de montrer la formule suivante, puis par changement d'indice :

$$\forall p \geq 2, \forall n \in \mathbb{N}, S(p, n) = \sum_{r=0}^n S(p-1, n-r) = \sum_{r=0}^n S(p-1, r).$$

Après plusieurs calculs de $S(2, n)$, éventuellement $S(3, n)$, il se dessine une formule générale, que l'on va maintenant montrer par récurrence sur l'entier p .

On pose :

$\mathcal{P}(p)$: « pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre de solutions dans $\mathbb{N}^p$ à l'équation :

$$\sum_{k=1}^p x_k = n$$

est égal à $S(p, n) = \binom{p+n-1}{p-1}$. »

- Lorsque $p = 1$, on a déjà vu que $S(p, n) = 1$ et la formule proposée est juste.
  - Supposons la propriété $\mathcal{P}(p)$ vérifiée pour un certain entier p dans $\mathbb{N}^*$.
- Soit n dans $\mathbb{N}$. On peut alors écrire compte tenu des éléments déjà vus que :

$$S(p+1, n) = \sum_{r=0}^n S(p, r).$$

On utilise l'hypothèse de récurrence pour écrire :

$$S(p+1, n) = \sum_{r=0}^n \binom{p+r-1}{p-1}.$$

On ouvre maintenant une petite parenthèse pour simplifier cette somme. On montre par récurrence normale sur l'entier m , la formule suivante, l'entier p étant fixé :

$$\sum_{r=0}^m \binom{p+r-1}{p-1} = \binom{p+m}{p}.$$

→ Lorsque $m = 0$, la formule devient $1 = 1$, ce qui est vrai.

→ Supposons la formule vraie pour un certain entier m .

→ On en déduit :

$$\begin{aligned} \sum_{r=0}^{m+1} \binom{p+r-1}{p-1} &= \sum_{r=0}^m \binom{p+r-1}{p-1} + \binom{p+m}{p-1} \\ &= \binom{p+m}{p} + \binom{p+m}{p-1} \quad [\text{H.R.}] \\ &= \binom{p+m+1}{p} \quad [\text{formule de Pascal}] \end{aligned}$$

On obtient ce qu'il faut et on referme cette parenthèse...

Par conséquent, en reprenant le fil de nos calculs :

$$S(p+1, n) = \sum_{r=0}^n \binom{p+r-1}{p-1} = \binom{p+n}{p}.$$

On obtient la formule voulue au rang suivant $p+1$.

Conclusion, la réponse demandée vaut : $\binom{p+n-1}{p-1}$.

2. On trouve un lien entre les deux questions.

L'application $\Phi : (x_1, \dots, x_p) \mapsto (x_1 - 1, \dots, x_p - 1)$ est une bijection entre l'ensemble $\mathcal{A}$ des solutions dans $(\mathbb{N}^*)^p$ à l'équation $\sum_{k=1}^p x_k = n$ et l'ensemble $\mathcal{B}$ des solutions dans

$\mathbb{N}^p$ à l'équation $\sum_{k=1}^p x_k = n - p$.

On en déduit que les ensembles finis $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ ont le même cardinal et on conclut que

la réponse demandée vaut :

$$\binom{n-1}{p-1}.$$

Remarque : lorsque $p > n$, il n'y a aucune solution dans $(\mathbb{N}^*)^p$ à l'équation proposée et cela correspond bien à la formule donnée.

Exercice 21

On suppose le contraire de l'assertion proposée, à savoir :

« la somme de trois quelconques des nombres $n_1, \dots, n_9$ est strictement inférieure 30. »

On en déduit :

$$A_1 = n_1 + n_2 + n_3 < 30, \quad A_2 = n_4 + n_5 + n_6 < 30 \quad \text{et} \quad A_3 = n_7 + n_8 + n_9 < 30.$$

Conclusion,

$$90 = \sum_{i=1}^9 n_i = A_1 + A_2 + A_3 < 30 + 30 + 30 = 90$$

et on aboutit à une contradiction.

Exercice 24

1. En disposant les n tours selon une diagonale, alors on a une disposition convenable. Le nombre demandé est au moins égal à n .

Supposons une configuration convenable avec p tours.

Chaque colonne contient au maximum une seule tour : il y a moins ou autant de tours que de colonnes : $p \leq n$ et finalement

la réponse vaut n .

2. $\rightarrow$ Si $p > n$, la réponse est 0.

$\rightarrow$ Supposons maintenant $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

On choisit déjà les p lignes parmi les n lignes qui contiendront les p tours dans une position convenable. Cela fait $\binom{n}{p}$ choix de lignes.

On choisit maintenant les p colonnes qui contiendront les p tours dans une position convenable. Cela fait $\binom{n}{p}$ choix de colonnes.

Cela fait donc $\binom{n}{p}^2$ de sous-échiquiers de format $p \times p$.

Une fois que ce sous-échiquier est choisi, il s'agit de disposer les p tours en position convenable dans ce sous-échiquier. Il s'agit de placer la première tour dans la première colonne : cela fait p choix, puis placer la deuxième tour dans la deuxième colonne, ce qui fait $(p-1)$ choix, etc. jusqu'à placer la dernière tour dans la dernière colonne, ne laissant qu'un seul choix, les $(p-1)$ lignes ayant déjà été choisies.

Conclusion, il y a $\binom{n}{p}^2 \times p!$ configurations possibles.

Exercice 25

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $f(n) > a$.

On distingue deux cas :

- si $f(n)$ est pair, alors $f(n+1) = \frac{f(n)}{2} < f(n)$ et l'entier $n' = n+1$ convient ;
- si $f(n)$ est impair, alors $f(n+1) = f(n) + a$ est un entier pair, puis :

$$f(n+2) = \frac{f(n+1)}{2} = \frac{f(n) + a}{2} < f(n).$$

L'entier $n' = n+2$ convient dans ce cas.

Quoi qu'il arrive, on trouve bien un entier $n' > n$ convenable.

2. Soit n dans $\mathbb{N}$.

Supposons par l'absurde que :

$$\forall n' > n, f(n') > a.$$

En utilisant la première question, on trouve un entier $n_1 > n$ tel que $f(n_1) < f(n)$.

Comme $f(n_1) > a$, il existe $n_2 > n_1$ tel que $f(n_2) < f(n_1)$.

On construit par récurrence des entiers $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ tels que pour tout entier $k \geq 2$,

$$f(n_k) < f(n_{k-1}).$$

La suite $(f(n_k))_{k \in \mathbb{N}^*}$ est donc strictement décroissante donc injective de $\mathbb{N}^*$ vers l'ensemble fini $\llbracket 0, f(n) \rrbracket$: ceci est impossible car l'ensemble $\mathbb{N}^*$ est infini alors que l'ensemble $\llbracket 0, f(n) \rrbracket$ est fini.

On obtient donc ce qu'il faut, suite à cette contradiction.

3. La question précédente montre que l'ensemble :

$$\mathcal{D} = \left\{ n \in \mathbb{N} \mid f(n) \leq a \right\}$$

n'est pas majoré.

Comme l'ensemble $\mathcal{D}$ est inclus dans $\mathbb{N}$, alors l'ensemble $\mathcal{D}$ est infini.

L'application :

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{D} & \longrightarrow & \llbracket 0, a \rrbracket \\ n & \longmapsto & f(n) \end{cases}$$

ne peut être injective.

Il existe $n_1 < n_2$ dans $\mathcal{D}$ tels que $f(n_1) = f(n_2)$.

On montre alors facilement par récurrence que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, f(n_1 + k) = f(n_2 + k).$$

On en déduit que :

$$\forall k \geq n_1, f(k) = f(k + (n_2 - n_1)).$$

La suite $(f(n))_{n \in \mathbb{N}}$ est donc périodique de période $(n_2 - n_1)$ à partir du rang n_1 .

Exercice 26

- On montre le sens direct par contraposé.

On suppose qu'il existe une fonction $f : E \rightarrow E$ telle que pour toute partie A non vide telle que $f(A) \subset A$, alors $A = E$.

Prenons un élément a dans E . On note dans la suite $f^{\circ n}$ la composée de la fonction f n fois avec elle-même de sorte que :

$$f^{\circ 0} = \text{id}_E, f^{\circ 1} = f, f^{\circ 2} = f \circ f, \text{ etc.}$$

Considérons maintenant l'ensemble :

$$A = \{f^{\circ n}(a) ; n \in \mathbb{N}^*\}.$$

On voit alors que :

$$\begin{aligned} f(A) &= \{f(f^{\circ n}(a)) ; n \in \mathbb{N}^*\} \\ &= \{f^{\circ(n+1)}(a) ; n \in \mathbb{N}^*\} \\ &= \{f^{\circ n}(a) ; n \geq 2\}. \end{aligned}$$

On en déduit $f(A) \subset A$, la partie A étant non vide car contient $f(a)$. Par hypothèse, la partie A ne peut être différente de l'ensemble E . En définitive $A = E$.

On en déduit :

$$a \in E = A.$$

Il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$a = f^{\circ k}(a).$$

La suite $(f^{\circ n}(a))_{n \in \mathbb{N}}$ est donc k -périodique, ne prenant donc qu'un nombre fini de valeurs.

On conclut que :

$$E = A = \{a, f(a), f^{\circ 2}(a), \dots, f^{\circ(k-1)}(a)\},$$

qui est un ensemble fini.

- On montre le sens indirect par contraposition.

On suppose l'ensemble E fini. On pose :

$$E = \{b_1, \dots, b_n\},$$

les éléments b_i étant tous différents.

On considère l'application :

$$f : \begin{cases} E & \longrightarrow & E \\ b_k & \longmapsto & \begin{cases} b_{k+1}, \text{ si } k < n \\ b_1, \text{ si } k = n \end{cases} \end{cases}.$$

Soit A une partie non vide de E telle que $f(A) \subset A$.

Soit b_i un élément de l'ensemble A . Comme les éléments $f(b_i), f \circ f(b_i), f \circ f \circ f(b_i), \dots$ appartiennent tous à l'ensemble A , alors les éléments $b_{i+1}, b_{i+2}, \dots, b_n, b_1, b_2, \dots, b_i$ appartiennent tous à A et $A = E$.

On vient de montrer l'existence d'une fonction $f : E \rightarrow E$ telle que pour toute partie A non vide et différente de E , alors $f(A)$ n'est pas inclus dans A . Ceci est la négation de l'assertion de droite dans l'énoncé.

Exercice 29

On note $\mathcal{A}$ l'ensemble des polynômes $P(X)$ dont les coefficients sont égaux soit à 0, soit à 1. Le seul polynôme $P(X) \in \mathcal{A}$ de degré inférieur ou égal à $(2n)$ pour lequel la quantité $P(-2)$ est maximale est lorsque la forme développée du polynôme $P(X)$ fait apparaître un maximum de termes en X^{2k} et un minimum de termes en $X^{2\ell+1}$, avec $0 \leq k \leq n$ et $0 \leq \ell \leq n-1$. Il s'agit donc du polynôme :

$$P_{\max}(X) = \sum_{k=0}^n X^{2k}$$

pour lequel on a :

$$P_{\max}(-2) = \sum_{k=0}^n (-2)^{2k} = \sum_{k=0}^n 4^k = \frac{1-4^{n+1}}{1-4} = \frac{4^{n+1}-1}{3}.$$

De la même façon, le seul polynôme $P(X) \in \mathcal{A}$ de degré inférieur ou égal à $(2n)$ pour lequel la quantité $P(-2)$ est minimale est lorsque la forme développée du polynôme $P(X)$ fait apparaître un minimum de termes en X^{2k} et un maximum de termes en $X^{2\ell+1}$, avec $0 \leq k \leq n$ et $0 \leq \ell \leq n-1$. Il s'agit donc du polynôme :

$$P_{\min}(X) = \sum_{\ell=0}^{n-1} X^{2\ell+1}$$

pour lequel on a :

$$P_{\min}(-2) = \sum_{\ell=0}^{n-1} (-2)^{2\ell+1} = -2 \cdot \sum_{\ell=0}^{n-1} 4^\ell = -2 \times \frac{1-4^n}{1-4} = 2 \times \frac{1-4^n}{3}.$$

Il s'agit en fait de montrer que l'application :

$$\Phi : \begin{cases} \mathcal{A} & \rightarrow \mathbb{Z} \\ P(X) & \mapsto P(-2) \end{cases} \quad \text{est une bijection !}$$

▷ On commence par montrer l'injectivité.

Soient $P(X)$ et $Q(X)$ dans $\mathcal{A}$ tels que $\Phi(P) = \Phi(Q)$. Par l'absurde, on suppose que $P(X) \neq Q(X)$, de sorte qu'en posant le polynôme $R(X) = P(X) - Q(X)$, alors :

- le polynôme $R(X)$ est non nul et à coefficients dans l'ensemble à trois éléments $\{-1, 0, 1\}$
- $R(-2) = 0$.

On écrit le polynôme $R(X) = \sum_{k=0}^r \varepsilon_k \cdot X^k$, avec chaque ε_k valant ± 1 ou 0. On note k_0 le plus petit indice tel que $\varepsilon_{k_0} \neq 0$, de sorte que :

$$\varepsilon_{k_0} \cdot (-2)^{k_0} = - \sum_{k=k_0+1}^N \varepsilon_k \cdot (-2)^k$$

ou encore, en divisant par $(-2)^{k_0}$:

$$\varepsilon_{k_0} = - \sum_{k=k_0+1}^N \varepsilon_k \cdot (-2)^{k-k_0}.$$

Cette égalité est tout bonnement impossible puisque le terme de gauche vaut ± 1 , donc est un entier impair, alors que le terme de droite est factorisable par 2, donc est un entier pair.

Nécessairement, les deux polynômes $P(X)$ et $Q(X)$ sont égaux.

▷ On termine par la surjectivité, en utilisant la première question.

Soit $p \in \mathbb{Z}$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^{n+1} - 1}{3} = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \times \frac{1 - 4^n}{3} = -\infty$, il existe un entier n suffisamment grand pour que l'entier p appartienne à l'ensemble d'entiers :

$$I_n = \left\{ 2 \times \frac{1 - 4^n}{3}, 2 \times \frac{1 - 4^n}{3} + 1, \dots, \frac{4^{n+1} - 1}{3} - 1, \frac{4^{n+1} - 1}{3} \right\}.$$

Maintenant, désignons par $\mathcal{A}_n$, l'ensemble des polynômes $P(X) \in \mathcal{A}$ de degré inférieur ou égal à $(2n)$. L'ensemble $\mathcal{A}_n$ est fini et compte 2^{2n+1} éléments, car chaque polynôme $P(X)$ dans $\mathcal{A}_n$ est de la forme :

$$P(X) = \sum_{k=0}^{2n} \varepsilon_k \cdot X^k,$$

et il y a exactement deux choix possibles pour chaque ε_k , les choix étant indépendants les uns des autres.

Par injectivité de l'application Φ , on sait que l'ensemble $\Phi(\mathcal{A}_n)$ – qui est en fait l'ensemble de tous les entiers de la forme $P(-2)$, lorsque $P(X)$ décrit l'ensemble $\mathcal{A}_n$ – est un ensemble de même cardinal que celui de $\mathcal{A}_n$, c'est-à-dire 2^{2n+1} .

Or, la première question montre que l'ensemble $\Phi(\mathcal{A}_n)$ est inclus dans l'ensemble d'entiers I_n , lequel compte $\frac{4^{n+1} - 1}{3} - 2 \times \frac{1 - 4^n}{3} + 1 = 2 \times 4^n = 2^{2n+1}$ éléments.

L'inclusion $\Phi(\mathcal{A}_n) \subset I_n$ se transforme en égalité d'ensembles, par égalité des cardinaux.

Or, par choix de l'entier n , on sait depuis le début que l'entier p appartient à l'ensemble $I_n = \Phi(\mathcal{A}_n)$: il existe un polynôme $P(X) \in \mathcal{A}$ – et en fait de degré inférieur ou égal à $(2n)$ – tel que :

$$p = \Phi(P) = P(-2).$$

La surjectivité de Φ est acquise.

Exercice 30

On commence par utiliser la formule :

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \cdot \tan b},$$

avec $a = \frac{\pi}{3}$ et $b = \frac{\pi}{4}$, ce qui induit :

$$\tan \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3} - 1}{1 + \sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{2} = 2 - \sqrt{3}.$$

Pour tout entier k entre 1 et 13, on pose :

$$\alpha_k = \arctan x_k$$

de sorte que chaque α_k appartient à l'intervalle $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.

On découpe le secteur angulaire $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ en douze parties de même amplitude angulaire $\frac{\pi}{12}$:

Les treize angles $\alpha_1, \dots, \alpha_{13}$ se rangent dans les douze petits secteurs angulaires : il existe deux nombres $\alpha_j \leq \alpha_i$ se rangeant dans le même, donc :

$$0 \leq \alpha_i - \alpha_j < \frac{\pi}{12}.$$

On conclut en utilisant la valeur de $\tan \frac{\pi}{12}$, puis la stricte croissance de la fonction $\tan$ sur l'intervalle $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ et enfin la formule $\tan \alpha_k = x_k$.

Exercice 32

1. Une séquence « 011 » correspond à la somme de deux termes de la forme :

$$\varphi^{k+1} + \varphi^k$$

dans l'expression de $x = \sum_{i \in A} \varphi^i$, en tenant compte du fait que le terme en φ^{k+2} ne fait pas partie de la somme.

Or,

$$\varphi^{k+1} + \varphi^k = \varphi^k \times (\varphi + 1) = \varphi^k \times \varphi^2 = \varphi^{k+2}.$$

On peut donc remplacer les deux termes $\varphi^{k+1} + \varphi^k$, par le seul terme φ^{k+2} , sachant que les termes φ^k et φ^{k+1} ne font désormais plus partie de la somme définissant x . La séquence « 100 » apparaît maintenant dans la décomposition de x , les autres ε_m n'étant pas modifiés.

2. Soit $x \in \mathcal{A}$.

Parmi toutes les décompositions possibles de x , on en choisit une avec un minimum de chiffres 1.

Il est impossible alors que deux chiffres 1 soient côte à côte. Si tel était le cas, on choisirait une séquence « 11 » la plus à gauche possible. Apparaîtrait alors la séquence « 011 » tout à gauche, séquence que l'on pourrait remplacer par la séquence « 100 », tout à gauche. Cette nouvelle décomposition serait encore associée à x mais comporterait un chiffre 1 de moins qu'avant : ceci contredirait la minimalité de la décomposition envisagée.

3. On montre par récurrence que tout entier $k \in \mathbb{N}^*$ est dans $\mathcal{A}$.

• L'entier $k = 1$ est dans $\mathcal{A}$, car $1 = \varphi^0$.

• Supposons l'entier k appartenant à $\mathcal{A}$, pour un certain entier k dans $\mathbb{N}^*$.

On examine une décomposition que l'on note D composée de 0 ou de 1 de l'entier k , la séquence D ne comportant pas deux chiffres 1 côte à côte.

Si $\varepsilon_0 = 0$ dans cette décomposition, on remplace $\varepsilon_0 = 0$ par 1, ce qui a pour effet d'obtenir une décomposition de $k + \varphi^0 = k + 1$.

Si $\varepsilon_0 = 1$ dans cette décomposition, on commence par transformer la séquence « 100 » tout à droite par la séquence « 011 ». Mis à part les deux 1 les plus à droite, il n'y a pas d'autres chiffres 1 consécutifs.

On réitère cette opération avec le chiffre 1 le plus à droite et qui est encadré de 0.

Après itérations jusqu'à modifier ε_0 , on obtient une décomposition où la séquence « $\varepsilon_0, \varepsilon_{-1}\varepsilon_{-2} = 1, 00$ » est modifiée en « 0, 11 ».

Dans cette nouvelle décomposition, à la place de ε_0 figure maintenant le chiffre 0 et en remplaçant ce chiffre 0 par 1, on obtient une décomposition de l'entier $k + 1$.

Dans tous les cas, l'entier $k + 1$ appartient à l'ensemble $\mathcal{A}$.

4. Supposons deux décompositions en or pur différentes.

Quitte à rajouter des 0 à droite ou à gauche, on peut décrire ces deux décompositions en or pur comme suit :

$$D = \varepsilon_q \varepsilon_{q-1} \cdots \varepsilon_0, \varepsilon_{-1} \cdots \varepsilon_{-p} \text{ et } D' = \chi_q \chi_{q-1} \cdots \chi_0, \chi_{-1} \cdots \chi_{-p}.$$

On considère le plus grand indice k tel que $\varepsilon_k \neq \chi_k$. Par exemple,

$$\varepsilon_k = 1 \text{ et } \chi_k = 0.$$

Les deux séquences

$$\Delta = \varepsilon_k \varepsilon_{k-1} \cdots \varepsilon_0, \varepsilon_{-1} \cdots \varepsilon_{-p} \text{ et } \Delta' = \chi_k \chi_{k-1} \cdots \chi_0, \chi_{-1} \cdots \chi_{-p}$$

sont donc égales car par maximalité de l'entier k :

$$\forall m > k, \varepsilon_m = \chi_m.$$

Les deux séquences Δ et Δ' sont associées au même réel :

$$y = x - \sum_{m=k+1}^q \varepsilon_m \cdot \varphi^m.$$

On en déduit que :

$$y \geq \varphi^k,$$

car le terme φ^k est présent dans la somme pour y avec éventuellement d'autres termes qui sont assurément positifs ou nuls.

Il est visible intuitivement que le réel y associé à la séquence

$$\chi_k \chi_{k-1} \cdots \chi_0, \chi_{-1} \cdots \chi_{-p} = 0 \chi_{k-1} \cdots \chi_0, \chi_{-1} \cdots \chi_{-p}$$

est inférieur ou égal au réel associé à la séquence :

$$01010\dots$$

Or, cette séquence est associée à la somme géométrique :

$$\xi_N = \sum_{i=0}^N \varphi^{k-1-2i},$$

où N est un entier suffisamment grand pour que $k-1-2N < -p$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} y \leq \xi_N &= \varphi^{k-1} \times \frac{1 - \varphi^{-2(N+1)}}{1 - \varphi^{-2}} \\ &< \varphi^{k-1} \times \frac{1}{1 - \varphi^{-2}} \\ &= \varphi^{k-1} \times \frac{\varphi^2}{\varphi^2 - 1} \\ &= \varphi^{k-1} \times \frac{\varphi^2}{\varphi} \\ &= \varphi^k. \end{aligned}$$

On obtient une contradiction du type « $\varphi^k \leq y < \varphi^k$. »

Les deux décompositions D et D' sont égales.

5. La réponse est non. En effet, il y a moins ou autant d'éléments dans $\mathcal{A}$ que de séquences finies de 0 ou de 1. Il y a une quantité dénombrable (en bijection avec $\mathbb{N}$) – que l'on peut noter $\aleph_0$ – de telles séquences finies. Il y a au maximum $\aleph_0$ éléments dans $\mathcal{A}$ et en fait exactement $\aleph_0$ éléments car tous les entiers naturels strictement positifs sont déjà dans $\mathcal{A}$.

Seulement voilà ... il y a bien plus de nombres réels strictement positifs ; il y en a autant que de nombres réels, et l'ensemble des réels n'est pas dénombrable.

Exercice 33

Soit $m = (u_i, \dots, u_{i+d-1})$ un d -motif de la suite u . On dira par la suite que le motif m commence à l'indice i .

Soit $\ell \in \llbracket 1, d \rrbracket$.

On appelle sous-motif gauche de m de longueur ℓ , le ℓ -uplet $(u_i, \dots, u_{i+\ell-1})$.
On appellera sous-motif gauche de m , un sous-motif gauche de m d'une certaine longueur.
On appelle sous-motif droit de m de longueur ℓ , le ℓ -uplet $(u_{i+d-\ell}, \dots, u_{i+d-1})$.
On appellera sous-motif droit de m , un sous-motif droit de m d'une certaine longueur.
Soient $a = (a_1, \dots, a_p)$ et $b = (b_1, \dots, b_q)$ deux uplets.
On notera ab , le $(p+q)$ -uplet $(a_1, \dots, a_p, b_1, \dots, b_q)$.
En particulier, on notera respectivement $a0$, $a1$, $0a$ ou $1a$ les $(p+1)$ -uplets respectifs :

$$(a_1, \dots, a_p, 0), (a_1, \dots, a_p, 1), (0, a_1, \dots, a_p) \text{ et } (1, a_1, \dots, a_p).$$

Le sous-motif vide est un uplet de longueur 0. Si μ est ce sous-motif vide, alors pour tout uplet a , on a $\mu a = a\mu = a$.

Soient a et b deux motifs de longueur d de la suite u .

On dira que le motif a est un décalage du motif b vers la gauche s'il existe $r \in \mathbb{Z}$ tel que a soit le motif de u commençant à l'indice r et b soit le motif de u commençant à l'indice $r+1$.

Plus généralement, si $i \in \mathbb{Z}$, on dira que a est un décalage de i crans du motif b vers la gauche si il existe $r \in \mathbb{Z}$ tel que a soit le motif de u commençant à l'indice r et b soit le motif de u commençant à l'indice $r+i$.

• On commence par montrer par récurrence sur l'entier k , l'assertion suivante :

$\mathcal{P}(k)$: « soit m un motif de u de longueur $k-1$ tel que les uplets $m0$ et $m1$ soient encore des motifs de la suite u . L'ensemble des décalages des motifs $m0$ ou $m1$ de i crans vers la gauche, lorsque i parcourt $\llbracket 0, k-1 \rrbracket$ forme un ensemble à au moins $k+1$ éléments. »

—> si $k=1$, il suffit de considérer les deux sous-motifs 0 et 1, le motif m étant vide.

—> Supposons l'assertion $\mathcal{P}(k)$ vraie pour un certain entier naturel $k \geq 1$.

Soit m un motif de u de longueur k tel que les uplets $m0$ et $m1$ soient encore des motifs de la suite u . On considère le sous-motif droit m' de m de longueur $k-1$. Les uplets $m'0$ et $m'1$ sont des sous-motifs droits des motifs $m0$ et $m1$, donc sont des motifs de la suite u .

Par hypothèse de récurrence, on trouve $k+1$ motifs $\mu_1, \dots, \mu_{k+1}$ différents issus des motifs $m'0$ ou $m'1$ par décalages vers la gauche.

Pour tout $i \in \llbracket 1, k+1 \rrbracket$, le motif μ_i est de longueur k . On rajoute à ce motif le terme juste à sa droite dans la suite u , ce qui donne un motif λ_i de la suite u de longueur $k+1$ qui commence au même endroit que pour le motif μ_i .

Les motifs μ_i étant différents, les motifs $\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1}$ le sont aussi et sont tous issus de décalages vers la gauche de l'un des motifs $m0$ ou $m1$.

Le motif m est de longueur k , tout comme les motifs différents $\mu_1, \dots, \mu_{k+1}$.

▷ Si $m \notin \{\mu_1, \dots, \mu_{k+1}\}$, alors $m0 \notin \{\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1}\}$ et on dispose ainsi de $k+2$ motifs différents de longueur $k+1$ obtenus à partir de $m0$ ou $m1$ par décalages vers la gauche.

▷ Si $m \in \{\mu_1, \dots, \mu_{k+1}\}$, alors il existe un seul indice $i \in \llbracket 1, k+1 \rrbracket$ tel que :

$$m = \mu_i.$$

Le motif λ_i est de la forme $\lambda_i = \mu_i \varepsilon_i$, avec $\varepsilon_i \in \{0, 1\}$. On pose $\varepsilon'_i = 1 - \varepsilon_i \in \{0, 1\}$ et on considère le motif :

$$m \varepsilon'_i.$$

Alors, $m\varepsilon'_i \notin \{\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1}\}$ car sinon, il existerait un indice j entre 1 et $k+1$ tel que $m\varepsilon'_i = \lambda_j$. En prenant les sous-motifs gauche de longueur k , on aurait $m = \mu_j$, puis $j = i$ et on aurait alors $m\varepsilon'_i = \lambda_i = m\varepsilon_i$, mais $\varepsilon_i \neq \varepsilon'_i$.

De nouveau, on dispose de $k+2$ motifs différents de longueur $k+1$ obtenus à partir de $m0$ ou $m1$ par décalages vers la gauche.

L'assertion $\mathcal{P}(k+1)$ est vérifiée.

• On revient à notre problème.

On note $B_1, \dots, B_d$ les d motifs de longueur d apparaissant dans la suite u .

Pour tout $i \in \mathbb{Z}$, il existe un seul indice $f(i) \in \llbracket 1, d \rrbracket$ tel que le motif $(u_i, \dots, u_{i+d-1})$ – que l'on notera m_i par la suite – soit le motif $B_{f(i)}$.

Il suffit de montrer que la fonction $f : \mathbb{Z} \rightarrow \llbracket 1, d \rrbracket$ est d -périodique pour avoir la d -périodicité de la suite u .

On suppose par l'absurde que la fonction f n'est pas d -périodique.

On note

$$\mathcal{D} = \left\{ \ell \in \mathbb{N}^* \mid \exists i \in \mathbb{Z}, f(i) = f(i + \ell) \right\}.$$

La fonction f n'étant pas injective, l'ensemble $\mathcal{D}$ est non vide.

Supposons un instant que pour tout $i \in \mathbb{Z}$, les indices $f(i), f(i+1), \dots, f(i+d-1)$ soient différents.

Soit i dans $\mathbb{Z}$. On en déduit que

$$f(i) \notin \{f(i+1), \dots, f(i+d-1)\}$$

et que

$$f(i+d) \notin \{f(i+1), \dots, f(i+d-1)\}.$$

Nécessairement, $f(i) = f(i+d)$ car l'ensemble $\{B_1, \dots, B_d\} \setminus \{f(i+1), \dots, f(i+d-1)\}$ est un singleton.

On aurait alors la d -périodicité de la fonction f , ce qui est exclu.

Il existe donc $i \in \mathbb{Z}$ tel que les entiers $f(i), \dots, f(i+d-1)$ ne soient pas tous différents.

On trouve $i \leq r < s \leq i+d-1$ tels que $f(r) = f(s)$. Ainsi, $\ell = s-r \in \mathcal{D}$ et $1 < \ell = s-r < d$.

Les motifs m_r et m_s sont égaux et distants de $\ell = s-r$ l'un de l'autre.

On voit alors que :

$$(u_r, u_{r+1}, \dots, u_{r+d-1}) = (u_s, u_{s+1}, \dots, u_{s+d-1}).$$

Ainsi,

$$\forall n \in \llbracket 0, d-1 \rrbracket, u_{r+n} = u_{s+n} = u_{r+n+\ell}.$$

Le motif m_r présente une ℓ -périodicité.

L'ensemble

$$\mathcal{E} = \left\{ i \in \mathbb{Z}, f(i) = f(i + \ell) \right\}$$

contient r et l'ensemble $\mathcal{E}$ n'est pas égal à $\mathbb{Z}$ tout entier, car sinon, la suite $(f(i))_{i \in \mathbb{Z}}$ serait ℓ -périodique et la fonction f ne pourrait prendre qu'au maximum ℓ valeurs différentes avec $\ell < d$.

On note $\mathcal{C}$ la « composante connexe discrète » de l'entier r dans l'ensemble $\mathcal{E}$. Cette composante discrète n'est pas $\mathbb{Z}$, donc est de la forme :

$$\mathcal{C} = \llbracket a, b \rrbracket \text{ ou } \mathcal{C} = \llbracket -\infty, b \rrbracket \text{ ou encore } \mathcal{C} = \llbracket a, +\infty \rrbracket.$$

Si l'ensemble $\mathcal{C}$ est majoré, il existe $i \in \mathcal{C}$ tel que $i + 1 \notin \mathcal{C}$.

Si l'ensemble $\mathcal{C}$ n'est pas majoré, alors il est minoré. On peut alors remplacer depuis le début, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ par la suite $(u_{-n})_{n \in \mathbb{Z}}$, vérifiant que cette dernière suite admet exactement d motifs de longueur d et pour laquelle l'ensemble $\mathcal{C}$ sera majoré, les termes étant lus dans le sens inverse par rapport aux termes de la suite u .

On se ramène quoi qu'il arrive à l'existence d'un entier i tel que $i \in \mathcal{C}$ et $i + 1 \notin \mathcal{C}$.

Ainsi,

$$(u_i, \dots, u_{i+d-1}) = (u_{i+\ell}, \dots, u_{i+d-1+\ell}) \text{ et } (u_{i+1}, \dots, u_{i+d}) \neq (u_{i+1+\ell}, \dots, u_{i+d+\ell}).$$

On pose m le motif

$$m = (u_{i+1}, \dots, u_{i+d-1}).$$

On obtient que :

$$m = (u_{i+1+\ell}, \dots, u_{i+d-1+\ell}).$$

Le d -uplet mu_{i+d} est le motif dans u commençant à l'indice $i + 1$ alors que le d -uplet $mu_{i+d+\ell}$ est le motif dans u commençant à l'indice $i + 1 + \ell$. Ces deux uplets sont différents, donc ils sont globalement égaux (dans un ordre quelconque) aux deux motifs m_0 et m_1 .

D'après ce qui précède, on peut trouver au moins $d + 1$ motifs différents issus des décalages vers la gauche des motifs m_0 ou m_1 . Ceci met en contradiction l'hypothèse portant sur les d -motifs de la suite u .

Conclusion, la fonction f est bien d -périodique et la suite u l'est également.

Exercice 34

Supposons l'égalité établie pour toute partie A finie non vide de $\mathbb{R}$.

On pose $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, avec $a_1 < a_2 < \dots < a_n$.

La somme de droite peut être divisée en deux sous-sommes : la somme sur les parties B non vides de A et ne contenant pas a_n et celles qui contiennent a_n .

La première sous-somme porte sur toutes les parties B non vides de $A \setminus \{a_n\}$ et la deuxième sous-somme vaut $\alpha(A)$.

On en déduit que normalement, on devrait avoir la formule :

$$\begin{aligned} \alpha(A) &= \eta_+(A) - \eta_+(A \setminus \{a_n\}) \\ &= \prod_{i=1}^{n-1} (a_{i+1} - a_i + 1) - \prod_{i=1}^{n-2} (a_{i+1} - a_i + 1) \\ &= (a_n - a_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-2} (a_{i+1} - a_i + 1). \end{aligned}$$

En synthèse, on montre maintenant cette dernière formule par récurrence sur le cardinal de la partie finie non vide A , en commençant par un cardinal égal à 2. Dans toutes les notations, les réels a_i seront rangés dans l'ordre strictement croissant.

• Lorsque $A = \{a_1, a_2\}$, on a :

$$\begin{aligned} \alpha(A) &= \eta_-(\{a_2\}) + \eta_-(\{a_1, a_2\}) \\ &= 1 + (a_2 - a_1 - 1) = a_2 - a_1. \end{aligned}$$

On a ce qu'il faut, en rappelant que le produit vide vaut 1.

• Supposons la formule vraie pour toute partie finie A non vide de cardinal inférieur ou égal à un entier naturel $n \geq 2$ fixé.

Soit $A = \{a_1, \dots, a_n, a_{n+1}\}$ une partie de $\mathbb{R}$ de cardinal $n + 1$.

Les parties B de A contenant a_{n+1} sont exactement les parties de A de la forme $C \cup \{a_{n+1}\}$, l'ensemble C étant une partie quelconque de $A' = A \setminus \{a_{n+1}\}$.

Ainsi,

$$\begin{aligned}
\alpha(A) &= \sum_{C \subset A'} \eta_-(C \cup \{a_{n+1}\}) \\
&= \eta_-(\{a_{n+1}\}) + \sum_{C \subset A' \text{ et } C \neq \emptyset} \eta_-(C \cup \{a_{n+1}\}) \\
&= 1 + \sum_{i=1}^n \sum_{C \subset A' \text{ et } \max C = a_i} \eta_-(C \cup \{a_{n+1}\}) \\
&= 1 + \sum_{i=1}^n \sum_{C \subset A' \text{ et } \max C = a_i} \eta_-(C) \cdot (a_{n+1} - a_i - 1) \\
&= 1 + \sum_{i=1}^n (a_{n+1} - a_i - 1) \sum_{C \subset A' \text{ et } \max C = a_i} \eta_-(C) \\
&= 1 + \sum_{i=1}^n (a_{n+1} - a_i - 1) \cdot \alpha(\{a_1, \dots, a_i\}) \\
&= 1 + (a_{n+1} - a_1 - 1) + \sum_{i=2}^n (a_{n+1} - a_i - 1)(a_i - a_{i-1}) \prod_{j=1}^{i-2} (a_{j+1} - a_j + 1),
\end{aligned}$$

la dernière formule provenant du fait que si $b \in \mathbb{R}$, alors $\alpha(\{b\}) = 1$ et on utilise – pour la partie droite de la formule – l'hypothèse de récurrence forte.

Posons dans la suite,

$$\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket, \beta_i = \prod_{j=1}^{i-2} (a_{j+1} - a_j + 1).$$

On observe que si $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, alors :

$$(a_i - a_{i-1}) \prod_{j=1}^{i-2} (a_{j+1} - a_j + 1) = (a_i - a_{i-1} + 1)\beta_i - \beta_i = \beta_{i+1} - \beta_i.$$

On en déduit en reprenant le fil du calcul précédent :

$$\begin{aligned}
\alpha(A) &= 1 + (a_{n+1} - a_1 - 1) + \sum_{i=2}^n (a_{n+1} - a_i - 1)(\beta_{i+1} - \beta_i) \\
&= a_{n+1} - a_1 + (a_{n+1} - 1)(\beta_{n+1} - \beta_2) - \sum_{i=2}^n a_i(\beta_{i+1} - \beta_i)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= a_{n+1} - a_1 + (a_{n+1} - 1)(\beta_{n+1} - 1) - \sum_{i=2}^n a_i \beta_{i+1} + \sum_{i=2}^n a_i \beta_i \\
&= a_{n+1} \beta_{n+1} - \beta_{n+1} + 1 - a_1 - \sum_{i=2}^n a_i \beta_{i+1} + \sum_{i=2}^n a_i \beta_i \\
&= a_{n+1} \beta_{n+1} - \beta_{n+1} + 1 - a_1 - \sum_{i=3}^{n+1} a_{i-1} \beta_i + \sum_{i=2}^n a_i \beta_i \\
&= a_{n+1} \beta_{n+1} - \beta_{n+1} + 1 - a_1 + \sum_{i=3}^n (a_i - a_{i-1}) \beta_i + a_2 \beta_2 - a_n \beta_{n+1} \\
&= \sum_{i=2}^{n+1} (a_i - a_{i-1}) \beta_i - \beta_{n+1} + 1 \\
&= \sum_{i=2}^{n+1} (\beta_{i+1} - \beta_i) - \beta_{n+1} + 1 \\
&= \beta_{n+2} - \beta_{n+1} \\
&= (a_{n+1} - a_n) \prod_{i=1}^{n-1} (a_{i+1} - a_i + 1).
\end{aligned}$$

C'est la formule voulue au rang suivant.

Maintenant, on termine de montrer la formule de l'exercice par récurrence sur le cardinal n de l'ensemble A .

- Lorsque A est une partie de cardinal 1, la formule demandée devient : « $1 = 1$ », qui est vraie.
- Supposons la formule vérifiée pour toute partie A de cardinal n , pour un certain entier naturel non nul n .
- Soit $A = \{a_1, \dots, a_n, a_{n+1}\}$, une partie de $\mathbb{R}$ de cardinal $(n+1)$, les a_i étant rangés dans l'ordre croissant.

On pose $A' = A \setminus \{a_{n+1}\}$. On sait alors, d'après l'expression de $\alpha(A)$ que :

$$\alpha(A) = \eta_+(A) - \eta_+(A').$$

On en déduit – [les sommations sur les parties B excluent la partie vide] :

$$\begin{aligned}
\sum_{B \subset A} \eta_-(B) &= \sum_{B \subset A'} \eta_-(B) + \alpha(A) \\
&= \eta_+(A') + \alpha(A) \\
&= \eta_+(A).
\end{aligned}$$

C'est terminé.